

## CÉTACÉ DU MOIS – MAI

### Dauphin commun à bec court (*Delphinus delphis*, Linnaeus 1758)



**Anglais:** Short-beaked Common Dolphin  
**Espagnol:** Delfín común a pico corto  
**Allemand:** Gemeiner Delphin mit kurzen Schnabel  
**Sous-ordre:** Odontoceti  
**Famille:** Delphinidae  
**Genre:** *Delphinus*

**Espèce:** Deux autres espèces appartiennent au genre *Delphinus*: le dauphin commun à bec long *D. capensis* et selon certaines sources, le dauphin commun tropical, *D. tropicalis*, présent en Mer rouge et dans l'Océan indien. Une sous-espèce, de plus petite taille, est également reconnue en Mer noire *D.D. ponticus*.

#### LE SAVIEZ-VOUS ?

Les membres d'un groupe de dauphins communs, en chasse, encerclent le banc de poissons ciblé, qui forme une boule défensive, afin de se saisir plus facilement de leurs proies

**Habitat:** Cosmopolite, mais reparti inégalement. Mers et océans tempérés, subtropicaux et tropicaux.

**Population:** Plusieurs millions d'individus.

#### Identification sur le terrain: Facile

1. Dessin en forme de X, gris et ocre sur les flancs,
2. Corps svelte, d'assez petite taille,
3. Rostre très fin, long, bien marqué.

**Taille:** Adulte: 1,60 – 2,00 mètres  
A la naissance: 80-95 cm

**Poids:** 75-235 kg  
A la naissance: 10 kg

**Description:** Dauphin de taille moyenne au corps svelte et élancé. Les mâles sont généralement plus grands et plus lourds. Dos gris bleuté à noir. Deux grandes taches claires allongées se rejoignent en un point situé à

l'aplomb de la dorsale, formant un «X» gris et chamois à ocre sur les flancs. Le ventre est blanc. Aileron développé, falciforme, plus clair au centre. Rostre fin et long. Chaque mâchoire est munie de 50-60 dents fines et pointues.



**Régime alimentaire:** Poissons de surface vivant en bancs (ex. sardines) et calmars.


**Comportement:** Très grégaire; forme des groupes de plusieurs dizaines, certaines voire milliers d'individus, selon l'activité et la période de la journée. Nageur rapide (50-60 km/h). Saute souvent et vient volontiers nager à l'étrave des

embarcations. Groupes mixtes communs avec des globicéphales (*Globicephala sp.*). Nage parfois sur les vagues formées par les grandes baleines.

**Reproduction:** Pics d'activités de reproduction au printemps, en été ou en automne selon les sites. Maturité sexuelle: 7-8 ans. Gestation: 11 mois. Lactation: 16 mois. Intervalle entre les naissances: 2 ans. Longévité: 25 ans.

– **Statut de conservation:**

- **IUCN: LC:** Préoccupation mineure (2008)  
**EN:** En danger (Sous-population de Méditerranée en déclin)
- **CITES:** Appendice II
- **CMS:** Appendice II



- **Prélèvements:** De 1870 à 1983, la population de la mer noire a fait l'objet d'une pêche intensive de la part des Turcs et des Russes, qui a aujourd'hui diminué. La pêche pratiquée par de nombreux pays a été bannie dans les années 1980 (Pérou, Espagne, France). En Australie, Espagne, Italie et Turquie, certains pêcheurs continuent de les tuer pour utiliser leur chair comme appât ou parce qu'ils accusent les dauphins de détruire les filets et de consommer trop de poissons.
- **Pêches:** Espèce la plus capturée comme prise accidentelle par l'industrie des pêches, en raison de son abondance et parce qu'elle partage les mêmes niches alimentaires que les poissons pélagiques à fort intérêt commercial (ex. thon).
- **Aquaculture:** Le développement de l'aquaculture en Méditerranée a été corrélé avec le déclin de dauphins dans le Golfe de Vera, du à la raréfaction des proies.
- **Surpêche:** L'espèce a déserté les zones où les stocks de poissons se sont effondrés en Mer noire et Méditerranée.
- **Pollution environnementale:** Elle a causé la disparition de l'espèce de certaines zones, comme en mer d'Azov et sur certaines zones de Méditerranée. L'espèce est également sensible à la bioaccumulation de polluants et métaux lourds dans ses tissus.
- **Pollution acoustique:** Les fortes émissions de bruit, causées notamment par les exploitations de pétrole offshore, perturbent leur communication et leur orientation.
- **Captivité:** Au moins 90 individus sont morts en captivité en Nouvelle-Zélande, aux USA, en Roumanie et au Japon. L'adaptation médiocre de l'espèce pour les conditions de captivité s'est soldée par une mortalité élevée en bassin et une reproduction quasi nulle.



Référence: Boris Culik (2010) Odontocetes. The toothed whales: "*Delphinus delphis*". UNEP/CMS Secretariat, Bonn, Germany.  
 Crédits photo: © NOAA, © Air Freelancer.Flickr, © pete in dunbar.Flickr

