

## CÉTACÉ DU MOIS - Août

### Baleine à bec de Blainville (*Mesoplodon densirostris*, Blainville, 1817)



**Anglais:** Blainville's beaked whale  
**Espagnol:** Zifio de Blainville  
**Allemand:** Blainville zweizahnwal  
**Sous-ordre:** Odontoceti  
**Famille:** Ziphiidae  
**Genre:** *Mesoplodon*

#### LE SAVIEZ-VOUS ?

L'os de la mâchoire des baleines à bec de Blainville est extrêmement dense; plus que l'ivoire des éléphants, d'où son nom latin *Mesoplodon densirostris*.

**Espèce:** L'une des 14 espèces du genre *Mesoplodon*.

**Habitat:** Eaux tropicales et chaudes de tous les océans. Latitudes très élevées.  
Profondeurs privilégiées entre 130 et 1300 mètres selon les régions.

**Population:** Aucune estimation disponible.

#### Identification sur le terrain: Difficile

1. Corps robuste comprimé latéralement
2. Mâchoires inférieures incurvées
3. Petit aileron dorsal situé à l'arrière du corps

**Taille:** Mâle: 4,4 mètres  
Femelle: 4,6 mètres  
A la naissance: 1,9 mètres

**Poids:** Mâle: 800 kg  
Femelle: 1000 kg  
A la naissance: 60 kg



**Description:** Baleine à bec la plus commune, répandue et probablement abondante. Elle est uniformément grise; foncée sur la partie dorsale avec un ventre plus clair. Les adultes âgés, en particulier les mâles, présentent de nombreuses marques rondes et des cicatrices causées par les dents de congénères, au niveau des flancs et du dos. Le contour de l'œil est noir. Le rostre marqué est fin et assez long. La mâchoire inférieure caractéristique est fortement arquée. Les mâles ont une dent sur la partie supérieure de chaque arche de la mandibule inférieure. Les femelles ont les mâchoires supérieures et inférieures blanches.

**Régime alimentaire:** Calmars et de poissons (Gadidae et Myctophidae).

**Comportement:** Nageur discret et farouche. Les plongées sont d'au moins 22 minutes. Fait surface lentement en créant très peu de remous. Les individus passent peu de temps en surface durant la journée afin de réduire l'exposition aux prédateurs naturels: orques et grands requins. Forme de petits groupes de 3-9 individus composés de femelles, de leurs petits et d'un mâle.

**Reproduction:** Les femelles atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 9 ans. Elles mettent bas à un unique petit.



- **Statut de conservation:**
- **IUCN: DD:** Données insuffisantes
- **CITES:** Appendice II
- **CMS:** Non listée



**Menaces:** L'espèce n'a jamais été ciblée par des chasses commerciales mais est occasionnellement tuée pour la consommation humaine aux Philippines et à Taïwan. Prises accidentelles reportées dans les filets des pêcheurs au Japon et à Hawaï. L'espèce peut confondre ses proies avec des débris de plastique et les ingérer, causant parfois la mort. Sensible à la pollution acoustique, et victime des sonars et tests acoustiques de la Navy, qui sont responsables d'échouages ponctuels.

**Références:** Boris Culik (2010) Odontocetes. The toothed whales: "*Mesoplodon densirostris*". UNEP/CMS Secretariat, Bonn, Germany.  
**Credit photo:** © DP © Colin D. McLeod